

Przygotowanie do kolonoskopii

Na badanie proszę przyjechać z osobą towarzyszącą. Czas trwania badania to około 30 minut. Ponieważ przed badaniem podajemy dożylnie sedację (midazolam oraz fentanyl – leki o działaniu uspokajającym, nasennym oraz przeciwbólowym) – nie wolno prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych przez 12 godzin po ich otrzymaniu

Leki przewlekle stosowane powinny być nadal przyjmowane. Modyfikacji wymaga leczenie cukrzycy oraz leczenie przeciwkrzepliwe – po konsultacji z endoskopistą i/lub lekarzem rodzinnym
Przed badaniem należy zdjąć biżuterię

Preparat Eziclen (wydawany na receptę)

W przeddzień badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – 0,5 litra w ciągu 30-60 minut, następnie preparat popija się wodą w ilości 1 litra w ciągu godziny

W dniu badania:

pacjent wypija sporządzony roztwór – 0,5 litra w ciągu 30-60 minut, następnie preparat popija się wodą w ilości 1 litra w ciągu godziny. Ostatnia dawka powinna być spożyta na 4 godziny przed kolonoskopią

DIETA

pacjent nie może nic jeść już w przeddzień badania (można pić klarowne płyny)

na 5-7 dni przed badaniem należy przestać spożywać pokarmy z pestkami

Godzina kolonoskopii	Pierwsza dawka w przeddzień badania	Druga dawka w dniu badania	Koniec picia drugiej dawki
7:30	14:00	2:30	3:30
8:30	14:00	3:30	4:30
9:30	14:00	4:30	5:30
10:30	14:00	5:30	6:30
11:00	14:00	6:00	7:00

Dawka leku to 1/2 litra przygotowanego leku eziclen oraz 1 litr wody